

I funghi rari o interessanti delle nostre zone: *leccinum corsicum* (Rolland)

(Bruno Brizzi)

DESCRIZIONE

Il “leccino” (*Leccinum lepidum* bouchet) è senza dubbio uno dei boleti più comuni delle nostre zone. E’ un fungo ricercato assiduamente fino dai tempi passati ed i suoi caratteri morfologici, insieme all’habitat specifico, sempre sotto leccio a stagione inoltrata, ne fanno una specie facilmente riconoscibile dagli appassionati.

Forse non tutti sanno però che il nostro “leccino” ha una specie di fratello minore a lui molto simile, diffuso principalmente nelle regioni meridionali e insulari ma presente anche dalle nostre parti.




Fig. 1 : Carpofori di *Leccinum corsicum* Rolland

Eccone una breve descrizione:




Fig. 2 : Ife della cuticola pileica

LECCINUM CORSICUM (ROLLAND)

SINONIMI :

Krombholziella corsica, *boletus Sardous* (Saccardo e Belli)

CAPPELLO

5-8 (10) cm. Emisferico, guancialiforme. Cuticola untuosa a tempo umido; con il secco tende a screpolarsi : non separabile dalla carne sottostante.

TUBULI

Lunghi, liberi al gambo, giallo olivacei

PORI




Fig.3 :Spore di *Leccinum corsicum* Rolland

Piccoli, rotondeggianti, gialli, al tocco diventano più scuri

GAMBO

Cilindrico, fusiforme, attenuato alla base, giallastro con superficie scabrosa.

CARNE

Giallastra, virante al taglio al rosa violaceo, con odore debole e sapore leggermente amaro.

HABITAT

Cresce esclusivamente sotto cisto

COMESTIBILITÀ

Commestibile

MICROSCOPIA

Spore ocracee in massa, fusiformi :

17.10-18.9X5.40-6.75 μm

Cuticola pileica formata da ife allantoidi :

φ=8.10-10.8 μm

NOTE

Le differenze macroscopiche fra le due specie non sono molto evidenti. Il *Leccinum corsicum* si distingue dal *lepidum* per le dimensioni mediamente più piccole e per il viraggio della carne meno marcato. Questi caratteri, da soli, non sarebbero forse sufficienti a separare i due funghi a livello specifico. Ben più importanti invece sono le differenze microscopiche e di habitat.

Mentre il *Leccinum lepidum* cresce esclusivamente sotto leccio, il *corsicum* lo possiamo trovare solo fra i cespugli di varie specie di cisto o nelle loro immediate vicinanze.

Microscopicamente il *Leccinum corsicum* presenta spore mediamente più piccole e ife della cuticola pileica molto più larghe.

Bruno Brizzi

BIBLIOGRAFIA

C.L. Alessio *Boletus* (*Krombholziella corsica*) (pag. 652)

Merlo, Rosso, Traverso *I Nostri Funghi* (*B. sardous*) (pag. 114)

B. Cetto *I Funghi dal vero* (*B. sardous*) **IV**, 1563